

CTLL-2 小鼠 T 细胞

使用说明书

细胞名称 Cell name	CTLL-2 小鼠 T 细胞
货号 NO.	ZQ1105
描述 Description	CTLL-2 细胞是一株具有细胞毒作用的 IL-2 依赖型的 T-细胞株。 注意：该细胞为 IL-2 依赖型细胞，实验室可以常备 IL-2，若发现细胞状态不好，散在细胞变多，细胞不生长等情况，以 100U/mL 的浓度添加 IL-2，培养 2-3 天后状态会有所改善；此外，该细胞冻存后再复苏需要 2 周左右时间来调整状态，调整过程中细胞碎片较多，具体操作请咨询技术进行指导
种属 Species	小鼠
组织 Tissue	T 细胞
形态 Morphology	淋巴母细胞
培养特性 Culture Properties	悬浮
安全性 Safety	所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护
培养基 Culture Medium	RPMI-1640（品牌：中乔新舟 货号：ZQ-200）+10%FBS（货号：ZQ500-A）+1%P/S（中乔新舟 货号：CSP006）+100U/mL recombinant IL-2（中乔新舟 货号：RPN0137）+1.0 μg/mL Con A 配套完全培养基：（中乔新舟 货号：ZM1105） 温度：37°C 气相：95%空气，5%二氧化碳
细胞复苏 Cell Thawing	注意：低温保存的细胞非常脆弱，请将冻存管放入 37°C 的水浴中解冻，尽快复苏细胞。 1. 在无菌区准备好 15ml 离心管和 T-25 培养瓶并分别加入 5ml 完全培养基； 2. 将冻存管放入 37°C 水浴锅中，握住冻存管不停晃动，直到内容物完全融化。然后立即将冻存管从水浴中取出，擦干并喷洒 75%乙醇，移至无菌区； 3. 小心地拆卸盖子，不要碰到里面的螺纹，用移液枪轻轻吸出细胞悬液，加入到准备好的 15ml 离心管中，1000rpm 离心 5min； 4. 弃上清后，轻弹离心管底部分散细胞沉淀，加入适量完全培养基重悬细胞后转入准备好的 T25 培养瓶（建议加液量：5~7ml）； 5. 轻轻摇动培养瓶使细胞均匀分布，如有必要（如使用不透气瓶），松开阀盖，以便气体交换。 6. 将培养瓶放入 CO ₂ 培养箱中培养。
传代 Subculturing	收到细胞后，请对细胞培养瓶外表进行消毒，将细胞置于培养箱中进行 1-2 小时的缓冲，待其恢复细胞基本生长状态后，将整瓶细胞及培养液分批离心，详细操作参考下面步骤。

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 缓冲后, 用 75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到生物操作台内, 严格无菌操作, 打开细胞培养瓶, 若培养瓶上无特殊标注, 以 1000rpm, 5min 将所有细胞悬液分别离心后收集于离心管中, 半悬浮细胞, 悬浮细胞操作同上。 2. 根据离心后的细胞量进行放回培养或分瓶培养 (建议第一次处理时分 2 个 T-25 培养瓶培养每瓶加培养基约 7ml), 第二天根据培养基颜色和细胞密度判断后补液; 3. 对于悬浮细胞和半悬浮细胞, 请根据细胞数量、培养基体积和培养基颜色判断后及时进行补液(补液量不要超过原体积的 1/3)。 4. 待细胞密度达到 80% 以上, 可进行分瓶或换液, 换液时将所有细胞培养液 1000rpm, 5min 离心, 不建议频繁进行离心。 5. 离心后弃上清, 加入新鲜培养基重悬细胞, 根据细胞数量分瓶培养。 6. 如果没有特别说明, 收到细胞后的第一次传代比例为 1:2, 培养液必须常温。 <p>注: 1. 观察细胞密度最好用 (4X 物镜) 低倍镜观察, 以便正确的判断细胞密度; 观察细胞形态请用 (10X 或 20X) 高倍镜观察;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 瓶中运输的培养液不能重复使用, 请换新鲜培养液培养; 3. 悬浮细胞聚团生长这个现象, 如果在培养期间出现较大团块时可在补液时轻轻吹匀细胞, 有部分小团块属于正常现象; 细胞达到传代密度时出现较大团块, 将细胞离心后去除上清轻弹管底沉淀再重悬进行接种; 4. 细胞对血清质量较为敏感, 建议使用进口大品牌优质血清进行培养; 5. 瓶中运输的培养液不能重复使用, 请及时更换新鲜培养液; 6. 请保持无菌操作, 瓶盖开启前请将培养瓶瓶口再次消毒、过火; 7. 对于半悬浮细胞, 如有必要可用低浓度消化液消化贴壁细胞。
<p>保存 Storage</p>	<p>冻存条件: 无血清细胞冻存液 (中乔新舟 货号: CSP042) 保存条件: 液氮存储</p>
<p>供应限制 Product Use</p>	<p>仅供研究之用</p>
<p>常见问题及解决方案 Questions and solutions</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在收到细胞后先观察培养瓶是否破裂, 漏液等, 如遇到上述问题请及时拍照并与我们联系。 2. 贴壁细胞: 培养瓶不开封, 显微镜下检查细胞状态, 瓶口酒精擦拭后平躺放置在培养箱。1-2 小时后观察, 如细胞大部分又贴回瓶底, 表明细胞活力正常, 剩余少量漂浮的细胞可以去掉, 留 8-10ml 培养液培养观察, 细胞生长至汇合度到达 85% 左右, 进行消化传代; 如细胞仍不贴壁, 将细胞离心收集转到新培养瓶, 原培养瓶加部分培养液继续培养, 注意观察。如细胞仍不能贴壁, 请用台盼蓝染色鉴定细胞活力, 并及时拍照 (多倍数多视野), 包括染色照片, 并联系我们。(以上仅为贴壁细胞处理方法) 3. 悬浮细胞: 培养瓶不开封, 显微镜下检查细胞状态, 瓶口酒精擦拭后平躺放置在培养箱。1-2 小时后观察, 将整瓶细胞及培养液分批离心 (1000rpm, 5min), 加入适量培养基, 根据离心后的细胞量进行放回培养或分瓶培养。(以上仅为悬浮细胞处理方法) 4. 半悬细胞: 培养瓶不开封, 显微镜下检查细胞状态, 瓶口酒精擦拭后平躺放置在培养箱。1-2 小时后观察, 将整瓶细胞培养液上层悬浮细胞离心 (1000rpm, 5min), 重悬细胞后加入原培养瓶培养至传代。细胞数量较大, 可将贴壁细胞消化下来, 与上层悬浮细胞混匀传代。重悬上层悬浮细胞时必须保持下层贴壁细胞的营养条件, 防止贴壁细胞缺乏营养。(以上仅为半悬细胞处理方法) <p>如遇到细胞培养问题请及时拍照并与我们联系, 我们的技术人员会一直跟踪指导。</p>



中乔新舟

Web: www.zqxzbio.com

销售 TEL: 021-56145703/021-56468627 免费热线: 4000389959
传真 FAX: 021-51262077 E-mail: sales@zqxzbio.com
地址: 上海市长江南路 180 号 A 区 402-406 室